

ವಂಡ್ಡ ತೀರುಲು ನಾಟೆ ಪದ್ಧತಿ



ಪಲ ಪಲ ನೋಡನಾ ಸ್ಥಾನ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಉದ್ಯಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಂ
ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಮೆದಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ.

పండ్ల మొక్కలు నాటే విధానం

పండ్ల చెట్లు బహువార్షికాలు మరియు ఎక్కువ కాలం దిగుబడినిచ్చే పంటలు, కావున నేలలు, రకాలు, వాతావరణం, నీటి వసతి, మార్కెట్టు సౌకర్యం గురించి తెలుసుకొని తోటలు నాటాలి.

తోటలు పెంపకానికి అనుమతి నేలలు మరియు నీరు

- ఎంపిక చేసిన స్థలంలో భూసార పరీక్ష తప్పనిసరిగా చేయించాలి.
- తోటలు పెంపకానికి 3 అడుగుల లోతు, 3 అడుగుల పాడవు, వెదల్పుగల గొయ్యని తవ్వి ప్రతి అడుగుకు ఒక నమూనా సేకరించాలి.
- నీరు నిలువని, సారవంతమైన నేలలు శ్రేష్ఠం. తక్కువ లోతుగల నేలలు మరియు రాతిపార లిగిన నేలలు పండ్లతోట పెంపకానికి పనికిరావు.
- పండ్లతోటలకు సాగు నీటిలో కోరెడ్ మరియు బైకార్బోనేట్లు తక్కువ ఉండాలి.

సిఫారసు చేయబడిన రకాలు



మామిడి



కోత రకాలు :

బేనిషాన్ (బంగినపల్లి), దశేరి,

తోతాపరి, కేసరి, సువర్ష రేఖ, హిమాయత్



రంజాలు :

చిన్నరసం, పెద్దరసం,

చెరకురసం, నవనీతం.



ఎచ్చుడి రకాలు :

జలాల్, తెల్లగులాబి, అమిని.



షైగాబ్రాడ్ రకాలు :

మల్లిక, నిలేషాన్,

మంజీర, ఆమ్రపాలి, రత్న



ప్రునాస రకాలు :

రాయల్ స్పెషల్,

బాబ్బిలి పునాస,

బారామసి



తియ్య మొముడి రకాలు :

పొజహన్,

నూజివీడు తియ్యమామిడి,

యలమందల తియ్యమామిడి

జాము

అలపోబాది సఫ్ట్‌చొ

లోకష్ట్ - 49

సఫ్ట్‌చ జము

సపోలు

కాలిపత్రు

వోలు

ధ్వనిర్పుగడి

సీతాఘలం

బాలాసనగర్

అట్టిమొయి × బాలాసనగర్


అట్టిమొయి

తొట్ట నాటుటకు ప్రణాళిక ("లే అవుట్") వేయుట :

- నేలను 2-3 సార్లు బాగా దున్ని చదును చేయాలి.
- మొక్కలను చతురస్రం లేదా దీర్ఘచతురస్రంలో నాటుకోవాలి. దీర్ఘచతురస్రం పద్ధతిలో నాటేటప్పుడు మొక్కల వరుసలు ఉత్తర-దక్కణ వైపు ఉండేటట్లు చూడాలి.
- పాలం చుట్టూ కంచెను వేయాలి. కంచె లోపల సరుగుడు, నీలగిరి, సిల్వర్ బిక్, టేకు, వెదరు వంటి మొక్కలను నాటి తోటను ఈదురు గాలి నుండి కాపాడవచ్చ మరియు పూత కాపు రాలకుండా నివారించవచ్చు.

గుంతలను తీయుట మరియు నింపుట

- గుంతలను మొక్కలను నాటడానికి 3-4 వారాల ముందే త్రవ్యాలి.
- నేల తీరు, పండ్ల రకాన్ని బట్టి సఫార్సు చేసిన ఎడంలో గుంతల ను త్రవ్యాలి. పట్టిక 1 (సారవంతమైన నేలలో ఎక్కువ దూరంలో మరియు తేలికపాటి ఎర్రనేలలలో తక్కువ దూరంలో గుంతలు త్రవ్యాలి.)
- గుంతలు తీసేటప్పుడు పై మట్టిని, లోపారలలోని మట్టిని వేరుగా కుప్పలు పోయాలి. పై పొర మట్టికి, గుంత పరిమాణం బట్టి 20-50 కిలోలు బాగా చివికిన ఎరువు, 1-2 కిలోల సూపర్ ఫాస్ట్టు + కార్బోపూర్యరాన్ గుళికలు 50 గ్రా. (చెదల నివారణకు) లేదా సెవిన్పాడి కలిపి నింపాలి.
- మట్టి తిరిగి గుంతలలో నింపిన తరువాత నీరు పెట్టాలి. దీనివలన మట్టి గుంతలలో సర్దుకుంటుంది.



పండ్ర రకాన్న బట్టి మొక్కల మధ్య సిఫార్సు చేసిన దూరం.


క్రమ సంఖ్య	రకం	మొక్కల మధ్య దూరం (మీటర్లు)	ఎకరానికి మొక్కల సంఖ్య	గుంతల పరిమాణం (మీటర్లు)
1.	మామిడి	10 × 10	42	$1 \times 1 \times 1$
		9 × 9	50	
		8 × 8	63	
		7.5 × 7.5	72	
2.	జాము	7 × 7	82	0.60×0.60
		6 × 6	111	
3.	సపోట	10 × 10	42	$1 \times 1 \times 1$
		9 × 9	50	
		8 × 8	63	
4.	సీతాఫలం	5 × 5	160	$0.60 \times 0.60 \times 0.60$

అంటు మొక్కల ఎంపిక

- మొక్కలను నమ్మకమైన నర్సరీ నుండి సేకరించుకోవాలి.
- చీడపీడలు ఆశించని అంటు మొక్కలను సేకరించుకొని నాటుకోవాలి.
- ఒకటి నుండి ఒకటిన్నర సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న మొక్కలను ఎంపిక చేసుకోవాలి.

మొక్కలు నాటే పద్ధతి

- అంటుమొక్కను మట్టిగడ్డతో సహా కవరును చింపి తీసి గుంత మధ్యలో నాటి మట్టిని గట్టిగా నొక్కాలి.
- నాటిన వెంటనే నీరు పోయాలి.
- మొక్కను నాటేటప్పడు అంటు భాగము భూమి పైకి 10-15 సెం.మీ. ఉండేటట్లు నాటుకోవాలి.



మొక్క నాటిన తరువాత జాగ్రత్తలు

- మొక్కలు నాటిన మొదటి 2 సంవత్సరాలు నీరు తప్పనిసరిగా పెట్టాలి. త్రిప్ నీటి పద్ధతిలో నీరు ఇచ్చు వలన నీరు ఆదా అవుతుంది.
- వేరు మూలం (రూట్ స్టోక్) నుండి వచ్చే కొమ్మలను ఎప్పటికప్పుడు కత్తిరించి తీసివేయాలి.
- మొక్కలు నాటిన వెంటనే కర పాతి మొక్కదీ ఊతమివ్వాలి.
- నాటిన తరువాత పాదులు తయారు చేసి కలుపును పెరగకుండా చూడాలి.
- ఎండాకాలంలో మొక్క పాదులలో ఎండుటాకులతో మల్చింగ్ చేయుటవలన భూమిలో తేమ ఆరిపోకుండా ఉంటుంది.
- ఆకు తొలుచు పురుగులు మరియు ఆకుమచ్చ నివారణకు డైమిథోయేట్ (2 మి.లీ.) లేదా మోనోక్రోటోఫాస్ (1.6 మి.లీ.) + బావిస్టిన్ (1 గ్రాము) లీటరు నీటికి కలిపి మొక్కలు తడిచేటట్లు పిచికారి చేయాలి.
- మొక్కలు బాగా పెరుగుటకు కొత్తగా వచ్చే చిగురుటాకులపై 1% పాలిఫీడ్ లేదా డి.ఎ.పి. పిచికారి చేయాలి.

Compiled by :

Dr. Ganta Sathyanarayana Reddy
Senior Scientist & head (Horticulture)

Dr. A Girwani
Scientist (Horticulture)

Dr. D. Anitha Kumari
Scientist (Entomology)

Fruit Research Station, Sangareddy,
Published by FRS Sangareddy, Medak District.
Andhra Pradesh.